

หนังสือแสดงความประสงค์รับการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคปีและการตรวจด้วยอัลตราซาวด์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... สถานที่.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลว่า ปากมดลูกในสตรีมีโอกาสดังกล่าวจะเกิดโรค ซึ่งสามารถกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต การคัดกรองมีหลายขั้นตอน นอกจากการตรวจเซลล์ หรือการตรวจหาเชื้อไวรัส เอช พี วี แล้ว ยังสามารถตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปี หรือกล้องส่องตรวจปากมดลูกได้ ซึ่งโดยปกติการตรวจด้วยกล้องส่องตรวจปากมดลูกนี้จะอยู่ในขั้นตอนหลังจากทราบผลการตรวจเซลล์ผิดปกติหรือพบเชื้อเอช พี วี ความเสี่ยงสูง และกล้องส่องตรวจปากมดลูกมีค่าใช้จ่ายสูง บางพื้นที่ที่มีควมตรวจนาน การใช้ง้องส่องตรวจปากมดลูกร่วมด้วย จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและความผิดปกติระยะก่อนเป็นมะเร็ง และลดขั้นตอนการเดินทางของผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกล ลดความแออัดของโรงพยาบาลบางพื้นที่ จึงได้จัดการบริการตรวจด้วยกล้องส่องตรวจปากมดลูก เพื่อช่วยหารอยโรคก่อนมะเร็ง หรือมะเร็งปากมดลูก เพื่อจะได้วางแผนการรักษาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจช่องท้องส่วนล่างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ทางช่องคลอดหรือทางหน้าท้องแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก และรังไข่ หากความผิดปกติ เช่น ก้อน ถุงน้ำ เนื้องอกต่างๆ ร่วมกับการตรวจภายใน ในสตรีโสดยังไม่มีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถตรวจอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องอย่างเดียวก็ได้ สตรีที่ตั้งครรภ์สามารถมาตรวจอัลตราซาวด์ได้

ขั้นตอนการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคปี มีดังนี้

1. ชักประวัติ วัดความดันและสัญญาณชีพ หากตั้งครรภ์หรือกำลังมีประจำเดือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย
2. ให้ผู้รับบริการปัสสาวะทิ้งและทำความสะอาดด้วยสเปรย์ภายนอก
3. เปลี่ยนชุดช่วงล่างเพื่อเตรียมตรวจภายใน ถอดกางเกงในออกให้เรียบร้อย
4. นอนหงายบนเตียงตรวจ ยกขาขวางบนขาหยั่ง ไม่ต้องเกร็ง หายใจปกติ
5. แพทย์จะใส่เครื่องมือตรวจภายในช่องคลอด จะรู้สึกอึดอัดช่องคลอดเล็กน้อย และใช้น้ำยาโซลีนปากมดลูก ซึ่งจะรู้สึกแสบๆ ประมาณ 1-2 นาที หลังจากนั้นแพทย์จะส่องกล้องปากมดลูก หากพบความผิดปกติ แพทย์อาจตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กบริเวณที่มีรอยโรคหรือขูดเนื้อเยื่อที่คอมดลูก ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เมื่อตรวจเสร็จแพทย์จะเอาเครื่องมือออก และตรวจคลำมดลูก และรังไข่ พร้อมกับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที หลังจากนั้นผู้รับบริการเปลี่ยนชุด แต่งตัวให้เรียบร้อย ในกรณีที่สงสัยว่ามีความผิดปกติ อาจต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติมในโรงพยาบาลของพื้นที่ ผู้รับบริการจะได้รับคำอธิบาย โป้นัดหรือใบส่งตัว โดยมีพยาบาลในพื้นที่ช่วยประสานงาน

คำแนะนำเพิ่มเติม

1. การตรวจภายใน ตรวจอัลตราซาวด์ อาจมีความระคายเคืองหรืออาจมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยเล็กน้อย ไม่ต้องเกร็งขณะตรวจ
2. กรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อ หรือขูดเนื้อเยื่อที่คอมดลูก มีโอกาสเสียเลือดได้ **ส่วนใหญ่ออกเพียงเล็กน้อย** และหยุดเองได้ กรณีมีการอักเสบของปากมดลูกอยู่ก่อน จะมีเลือดมาเลื้อยบริเวณนี้มาก เลือดอาจหยุดช้า แพทย์จะใส่ผ้าก๊อสนี้ในช่องคลอดและให้ยารักษาอาการอักเสบ โดยให้ผู้รับบริการสามารถดึงผ้าก๊อสนี้ออกเองเมื่อครบ 18-24 ชั่วโมง **ห้ามลืมหึงออก** หากยังมีเลือดสีแดงสดออกชุ่มผ้าอนามัย ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ และควรดื่มเพดส์อย่างน้อย 3-7 วัน แล้วแต่กรณี เพื่อให้แผลตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูกหายดี แพทย์จะแนะนำอีกที และต้องไปฟังผลตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ใช้เวลารอผล 10-14 วัน

3. กรณีตรวจอัลตราซาวด์พบความผิดปกติ จะได้รับการส่งตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและได้สอบถามจนเข้าใจ และมีความประสงค์ที่จะตรวจส่องกล้องปากมดลูกด้วยกล้องคอลโปสโคปี และรับบริการตรวจภายใน ตรวจอัลตราซาวด์แล้วแต่กรณี อาจต้องได้รับการตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกหรือส่งต่อไปดูแลรักษาเพิ่มเติม รวมถึงอนุญาตให้ทีมบริหารสุขภาพของมูลนิธิกาญจนบารมี บันทึกข้อมูลและหรือภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดูแลรักษา รวมถึงงานวิจัยในอนาคต ภายใต้ความปลอดภัยของการบริหารและข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ลงนามไว้เพื่อแสดงความประสงค์ในการตรวจ โดยสามารถยกเลิกการตรวจข้างต้นได้ตลอดเวลา

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้คำแนะนำ

(.....)

(.....)